

التحصينات
Immunization Schedule

ملاحظات Remarks	التاريخ والتوقيت			التحصين ضد Imm. Against
	الثالثة 3rd	الثانية 2nd	الجرعة الاولى 1st	
			10/1/14 10/1/14	الجدري BCG - BCG
			3/12/14 K. Booth	الكبد الفيروسي (ب) HBV
				التهاب السحايا Hexa التهاب كبدى ب- HBV الحمى التيفوئيدية DTaP السعال الديكي Hib هيموفيلس الفلورنزا شلل الأطفال المعطل IPV
				التهاب السحايا Penta التهاب كبدى ب HBV الحمى التيفوئيدية DTP السعال الديكي Hib هيموفيلس الفلورنزا
			22/2/15 K5393	شلل الأطفال القموي OPV
			H73047 22/2/15	المكورات الرئوية PCV
			AROLA 992BB 22/2/15	الفيروسات العجلية Rota Virus
			AHA1836AFH1415 792M 22/6/16	الكبد الوبائي (أ) Hep A
			AMJRD115AB1 800PC 918KA 22/6/16	الحصبة/الانكاف الحصبة الألمانية MMR
			AP002519 31/10/19	الجدري المائي Varicella


Infanrix Hexa
A21FC0108
05-2013
04-2016

Wyeth
PA027279
EXP 10 2016
MFD 11 2013
Lot J13200

Rotarix
AR01B066BA
12-2013
11-2016

التطور من ناحية التعرف على الأشخاص:

١-٩ أشهر
١-٩ أشهر
٤-٤ أشهر
٢-٢ أشهر



عمر
عمر
عمر
عمر
الحملقة والتربيز
في الوجوه
يترك عينيه لرؤيتك
التبسم للأشخاص
محدد
الركاء حين تتركين
الغرفة



عمر
التظاهر لوممه
خلال الليل

Mother blood group

O+ve

Baby blood group

O+ve.

DCT -ve

جدول مواعيد التطعيمات
Immunization Appointment Schedule

ملاحظات Remarks	درجة الحرارة Temperature	محيط الرأس H.C.	الطول Hgt.	الوزن Wt	العمر Age	التاريخ Date
22/10/2015	36 (A)	40	53	5.1g	11 months	22/10/15
12:00pm						
After 8	36 (A)	42	61	5.65	4 months	11-4-15 17-20-15
19-8-2015 11:55AM	36 (A)	43.5cm	66cm	6.5g	9 months	9/9/15
9-9-2015 2:20PM	36 (A)	45cm	69	7.15	1yr	14/9/15
16/12/2015 [16:40pm]	36.8 (A)	45.5cm	72cm	7.45	13/12	16/02/16
16-3-2016 18:30pm	36.7 (A)	45.5cm	75cm	8.05kg	16/3/16	28/6/16
11/11-17/11 11:09	37.2	50cm	100-8	13.30	4yr	3/10/16

ملاحظات	الحصنات المنشطة
	Tetra - 16-3-16 A14 CA 213B
	المحورات الربوية PCV B المشطبة 16-3-16 L03806
	تشلل الأطفال الفموي OPV B 19/09 31/10/19 M 5338
	الثلاثي - Td M 5338 31/10/19
	تيتانوس - Tetanus
	Others

الحساسية: Allergies

- تؤجل الرضاعة الطبيعية لمدة 48 دقيقة وذلك عند إعطاء التطعيم عن طريق الفم فقط أما التطعيمات بالحقن فيمكن الرضاعة بعدها مباشرة.
- يقض عمل كمادات باردة في يوم التطعيم ودامتة في الأيام التالية مكان التطعيم 3-4 مرات يوميا لمدة 2-3 أيام بعد التطعيم الرباعي.
- يجب عدم إعطاء الطفل مخفض الحرارة (باراسيتامول) قبل إعطاء التطعيم.
- يعطى مخفض الحرارة (باراسيتامول) عند ارتفاع الحرارة عند بعض الأطفال كل 4-6 ساعات لمدة 24 ساعة، وسواء ارتفعت الحرارة أم لم ترتفع فإن التطعيم يكون فعالاً.
- لا يقض وضع أي دهان أو كريمات مكان التطعيم

423678
اللقاحات آمنة تماما وفي الغالب لا يعقبها أي تأثيرات جانبية سيئة ولكن قد تحدث بعض المضاعفات النادرة الغير مرغوبة مما قد يستدعي الاتصال بالطبيب، ومن هذه الحالات:

- أظهرت عليه الحرارة أكثر من 39 درجة مئوية.
- أصيب بنوبة أو تشنجات - هذه الأعراض تكون عادة مصاحبة للارتفاع الشديد في درجة الحرارة.
- بواصل اليكاه أو الحركة الدائمة لمدة 24 ساعة.
- يظهر التفاح في مكان الإبرة.
- يبدو عليه العكاس بشكل غير طبيعي أو عدمه الإستجابة لك.

للمزيد من المعلومات حول جدول التطعيم واللقاحات في البرنامج الموسع للتحصين يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجالس الأعلى للصحة