



مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
PRIMARY HEALTH CARE CORPORATION

ولد / Boy

5#9086



HC NUMBER: HC03865881
NAME : TAWFIQ QAISI TAWFIQ ABUHAMAD
NATIONALITY : Jordanian
DOB : 25/06/2015
GENDER : Male
HC Expiry : 09/12/2016



المفكرة الصحية للط

عيادة الطفل السليم

Id Health Notebook

Well Baby Clinic



الإسم

Name



الرقم الشخصي

ID No.



الرقم الصحي

HC No.



المركز الصحي

Health Center

HC03865881
Baby Of Rawan Muayed Shabit
D.O.B : 25/06/2015
QID : Sex : M
HC Exp : Jordan
HMC :
PHC :
LOC : Date :

9086

33895241

PHC

0165691-X





التحصينات
Immunization Schedule

ملاحظات Remarks	التاريخ والتوقيع			التحصين ضد Imm. Against
	الثالثة 3rd	الثانية 2nd	الجرعة الاولى 1st	
			26/6/15 N. Mohamed N	الجرن - BCG
			25/6/15 Secemone	الكبد الفيروسي (ب) HBV
	A 21CC239A 16/11/15			السداسي Hexa النهاب كبدي ب - HBV الدفتريرا، التيتانوس السعال الديكي DTaP هيموفلس انفلونزا Hib شلل الأطفال المعطل IPV
	AP0019 3/2/2016		30/8/15 AP0023	الخماسي Penta النهاب كبدي ب HBV الدفتريرا، التيتانوس السعال الديكي DTP هيموفلس انفلونزا Hib
LS153 3/2/2016	LS153 16/11/15		30/8/15 K5536	شلل الأطفال الفموي OPV
	J13200 3/2/2016	J13200 16/11/15	30/8/15 J13200	المكورات الرئوية PCV
	AROLB1306B 16/11/15		30/8/15 AROLB3066BA	الفيروسات العنابية Rota Virus
	L048557 11/1/17		AHAVB836A1 29/6/16	الكبد الهائي (أ) Hep A
	AmJRD170AB 11/1/17		A-MJRD115AB 29/6/16	الحصبة/النكاف الحصبة الألمانية MMR
	A70CC0253A 3/2/19		A70CC640A 29/6/16	الحديري المائي Varicella

التحصينات
Immunization





ملاحظات	الجرعات المتداولة	
	A14CA 229A 10/10/16	الرباعي - Tetra
	LG0089 10/10/16	المكورات الرئوية المنشطة PCV B
	R3008 3/12/19	شلل الأطفال الفموي OPV B
	2044615 11/1/17	
	AC313313 3/12/19	الثلاثي - DTaP
		الثنائي - Td
		تيتانوس - Tetanus
		Others

الحساسية ل:

Allergies

- تؤجل الرضاعة الطبيعية لمدة ٤٥ دقيقة و ذلك عند إعطاء التطعيم عن طريق الفم فقط، أما التطعيمات بالحقن فيمكن الرضاعة بعدها مباشرة.
- يفضل عمل كمادات باردة في يوم التطعيم و دافئة في الأيام التالية مكان التطعيم ٣-٤ مرات يومها لمدة ٢ - ٣ أيام بعد التطعيم الرباعي.
- يجب عدم إعطاء الطفل مخفض للحرارة (باراسيتامول) قبل إعطاء التطعيم.
- يعطى مخفض الحرارة (باراسيتامول) عند ارتفاع الحرارة عند بعض الأطفال كل ٤-٦ ساعات لمدة ٢٤ ساعة و سواء ارتفعت الحرارة أم لم ترتفع فإن التطعيم يكون فعالاً.
- لا يفضل وضع أي دهان أو كريمات مكان التطعيم

٣ لللقاحات أمنه تماما و في الغالب لا يعقبها أي تأثيرات جانبية سيئة و لكن قد تحدث بعض

المضاعفات النادرة الغير مرغوبة مما قد يستدعي الإتصال بالطبيب، ومن هذه الحالات:

- أظهرت عليه الحرارة أكثر من ٣٩ درجة مئوية.
- أصيب بنهبة أو تشنجات - هذه الأعراض تكون عادة مصاحبة لارتفاع الشد في درجة الحرارة.
- يواصل البكاء أو الحركة الدائمة لمدة ٢٤ ساعة.
- يظهر انتفاخ في مكان الإبرة.
- يبدو عليه النعاس بشكل غير طبيعي أو عدم الإستجابة لك.

للمزيد من المعلومات حول جدول التطعيم واللقاحات في البرنامج الموسع للتحصين

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة